

فورت پزشکی است که به سرعت در جهت درمان آن باید اقدام شود.

۱- نوزاد باید در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شود.

۲- اقدامات درمانی اولیه مانند باز نگهداشتن راههای هوایی، دادن اکسیژن، تخلیه ترشحات، تهویه مناسب و قطع تغذیه دهانی و نمونه گیری خون انجام می شود.

۳- برای نوزاد داروهای ضد تشنج شروع می شود.

آیا تشنج نوزادی عوارض بعدی دارد؟

بستگی به علت تشنج، جواب سیتی اسکن و MRI وزن هنگام تولد و سن حاملگی نوزاد دارد. اگر نوزاد نارس بوده و وزن تولد او کم باشد یا جوی سیتی اسکن غیر طبیعی باشد نوزاد ممکن است در آینده مشکل داشته باشد.

داروی ضد تشنج تا چه زمانی باید مصرف شود مدت زمان استفاده از دارو (معمولاً قرص فنوباریتال) بر اساس نظر پزشک معالج با توجه به معاینه عصبی و جواب آزمایشات تعیین می شود.

آیا تشنج در نوزادان شایع است؟

تشنج در ایان نوزادی از همه ایام عمر شایعتر است. ۲ نوزاد از هر ۱۰۰۰ نوزاد ترم دچار تشنج در ماه اول زندگی میشوند تشنج در نوزد نارس و کم وزن شیوع بیشتری دارد.

اندام ها، حرکات شبیه مکیدن یا جویدن در دهان، حرکت غیر طبیعی و انحراف چشمها و یا توقف تنفس به مدت بیش از ۲۰ ثانیه و کبود شدن نوزاد حتما به پزشک یا بیمارستان مراجعه نماید.

همه حرکات غیر طبیعی نوزاد تشنج نیست و ارزیابی نوزاد برای تشخیص قطعی تشنج باید توسط پزشک انجام شود.

اگر با گرفتن حرکات غیر طبیعی اندامها متوقف شود تشنج نیست.

چگونه پزشک علت تشنج نوزاد را تشخیص می دهد؟ تشنج نوزاد معمولاً علامت یک بیماری زمینهای است که نیاز به ارزیابی فوری داد که باید در بیمارستان انجام شود.

ارزیابی بیمار شامل:

۱- گرفتن شرح حال دقیق

۲- معاینه کامل

۳- انجام آزمایش خون مانند قند، کلسیم، منیزیم، و سدیم

۴- گرفتن مایع کمر

۵- انجام آزمایشات تکمیلی مانند سونوگرافی، نوار مغز، سی تی اسکن مغز و یا MRI

درمان تشنج نوزادی چیست؟

تشنجی که در ۲۸ روز اول عمر روی می دهد به علت اینکه تکامل عصبی نوزاد را به مخاطره میاندازد، یک



تشنج نوزادی

علت تشنج در نوزادان چیست؟

- ۱- کمبود اکسیژن رسانی به مغز مانند مسمومیت حاملگی جدا شدن جفت، صدمات حوالی زایمان
- ۲- اختلالات مانند کاهش قند خون، کاهش کلسیم و منیزیم، کاهش یا افزایش سدیم خون
- ۳- خونریزی داخل مغزی که بیشتر در نوزادان نارس شایع است.

۴- عفونت ها مانند مننژیت

۵- اختلالات دستگاه عصبی

۶- اعتیاد مادر به مواد مخدر

۷- سکنه مغزی نوزادان

- ۸- سندرم محرومیت دارویی یا مواد مخدر شایعترین علت تشنج در دوران نوزادی، نرسیدن اکسیژن به مغز آنهاست که ممکن است در اثر حوادث زایمانی برای کودک همچون پیچیدن بند ناف به دور گردن آنها و یا نارس بودن کودک به وجود آید.

والدین چگونه بفهمند که نوزاد تشنج دارد؟

در صورت وجود حرکات غیر طبیعی اندام ها، پرش های عضلانی تکراری، لرزش پلک ها، سفت شدن

هو الشافي



موسسه خدمات درمانی البرز

با آرزوی سلامتی و موفقیت

پمفلت آموزشی

تشنج نوزادی

تهیه کننده: بخش NICU

بازنگری: اردیبهشت ۹۶

تنظیم: واحد آموزش



تشنج در نوزدان چه علایمی دارد؟

تشنج در نوزدان علایم متفاوتی دارد ممکن است به صورت حرکات شدید اندام ها، پرش های عضلانی تکراری، لرزش پلک ها، سفت شدن اندام ها، حرکات شبیه مکیدن یا جویدن در دهان، گریه غیر طبیعی.

یا حرکات غیر طبیعی چشمها دیده شود. در بعضی نوزادان تنها علامت تشنج توقف تنفس به مدت بیش از ۲۰ ثانیه و کمبود شدن نوزاد است (که بیشتر در نوزادان نارس دیده می شود).

